

پازو پائیب

قرص روکش دار ۲۰۰ میلی گرم و ۴۰۰ میلی گرم

پیش از شروع مصرف این دارو محتوای
دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.

سبحان
انکولوژی

پازو پائیب

قرص روکش دار ۲۰۰ میلی گرم و ۴۰۰ میلی گرم

سبحان
انکولوژی

ساخت شرکت داروسازی سبحان انکولوژی رشت-ایران

قبل از مصرف دارو، اطلاعات مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.


- دفترچه را نگه دارید، ممکن است مجدداً نیاز به مطالعه آن داشته باشید.

- اگر سوالات بیشتری در این زمینه دارید، از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

- این دارو فقط برای مشکل فعلی شما تجویز شده است، مصرف آن را به دیگران توصیه نکنید زیرا ممکن است برای آنها مضر باشد؛ حتی اگر علائمی مشابه بیماری شما داشته باشند.

مطالب مندرج در این دفترچه:

- ۱- پازوپانیب چیست و برای چه استفاده می شود؟
- ۲- اطلاعات/ اقدامات ضروری پیش از مصرف پازوپانیب
- ۳- پازوپانیب چگونه مصرف می شود؟
- ۴- عوارض جانبی احتمالی
- ۵- شرایط نگهداری پازوپانیب
- ۶- محتویات بسته بندی و اطلاعات بیشتر



۱. پازوپانیب چیست و برای چه استفاده می شود؟

پازوپانیب مهارکننده تیروزین کینازهای متعدد از جمله آن‌هایی است که با گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی عروقی

(VEGFR) مرتبط هستند.

پازوپانیب برای موارد زیر در بزرگسالان استفاده می شود:

- درمان خط اول کارسینوم سلول کلیوی پیشرفته
- درمان کارسینوم سلول کلیوی پیشرفته در بیمارانی که قبلاً درمان با سایتوکین را داشته اند.
- درمان انواع سارکوم های پیشرفته بافت نرم



۲. اطلاعات/ اقدامات ضروری پیش از مصرف پازوپانیب

از مصرف پازوپانیب خودداری کنید:

اگر به پازوپانیب یا هر یک از ترکیبات دیگر این دارو حساسیت دارید (ذکر شده در بخش ۶).

هشدارها

بیماری قلبی، فشار خون بالا، افزایش خطر فیستول های گوارشی، افزایش خطر سوراخ شدن دستگاه گوارش، افزایش خطر خونریزی، افزایش خطر میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک - در صورت بروز علائم سکتة مغزی ایسکمیک، انفارکتوس میوکارد، عوامل خطر ابتلا به آنوریسم یا دایسکشن شریان، درمان به طور دائم قطع شود، خطر حوادث ترومبوتیک، حساسیت به طولانی شدن فاصله QT (از جمله اختلالات الکترولیتی)، حمله ایسکمیک گذرا

جراحی انتخابی: درمان با پازوپانیب را ۷ روز قبل از جراحی انتخابی قطع کنید و فقط در صورت بهبودی کافی زخم،

مجدداً درمان را شروع کنید.
پایش فشار خون: فشار خون را به طور منظم کنترل کنید.
اطلاعات مهم ایمنی

خطر آنوریسم و دایسکشن شریان: مهارکننده های مسیر VEGF که به صورت سیستمیک تجویز می شوند ممکن است منجر به آنوریسم و دایسکشن شریان در بیماران با یا بدون فشار خون بالا شوند. بیماران باید تحت نظر باشند و در صورت لزوم از نظر فشار خون بالا تحت درمان قرار گیرند.

کودکان و نوجوانان

پازوپانیب برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود. هنوز

مشخص نیست که در این گروه سنی چقدر خوب عمل می کند. علاوه بر این، به دلیل نگرانی های ایمنی نباید در کودکان کمتر از ۲ سال استفاده شود.

سایر داروها و پازوپانیب

اگر داروی دیگری مصرف می کنید، اخیراً مصرف کرده اید یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. این شامل داروهای گیاهی و سایر داروهایی است که بدون نسخه خریداری کرده اید. برخی از داروها ممکن است بر نحوه عملکرد پازوپانیب تأثیر بگذارند یا احتمال بروز عوارض جانبی را افزایش دهند.

پازوپانیب همچنین می تواند بر عملکرد برخی از داروها

تأثیر بگذارد. این دارو ها شامل:

- کلاریترومایسین، کتوکونازول، ایتراکونازول، ریفامایسین، تلیترومایسین، وریکونازول (برای درمان عفونت استفاده می شوند).

- آتازاناویر، ایندیناویر، نلفیناویر، ریتوناویر، ساکویناویر (برای درمان HIV استفاده می شوند)

- نفازودون (برای درمان افسردگی استفاده می شود).

- سیمواستاتین و احتمالاً سایر استاتین ها (برای درمان سطوح بالای کلسترول استفاده می شوند).

- داروهایی که اسید معده را کاهش می دهند (مانند مهارکننده پمپ پروتون، آنتاگونیست های H_2 یا آنتی

اسیدها)، ممکن است بر نحوه مصرف پازوپانیب تأثیر بگذارد.

لطفاً برای مشاوره با پزشک یا پرستار خود مشورت کنید. در صورت مصرف هر یک از این موارد به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

پازوپانیب با غذا و نوشیدنی

پازوپانیب را با غذا مصرف نکنید، زیرا بر نحوه جذب دارو تأثیر می‌گذارد.

حداقل دو ساعت بعد از غذا یا یک ساعت قبل از غذا مصرف کنید (به بخش ۳ مراجعه کنید).

زمانی که تحت درمان با پازوپانیب هستید، آب گریپ

فروت ننوشید زیرا ممکن است احتمال بروز عوارض جانبی را افزایش دهد.

نارسایی کبدی

در موارد نارسایی کبدی خفیف تا متوسط، پازوپانیب باید با احتیاط مصرف شود و در موارد نارسایی کبدی شدید، منع مصرف دارد.

تنظیم دوز: در موارد نارسایی متوسط، دوز باید به ۲۰۰ میلی گرم روزانه کاهش یابد.

نارسایی کلیوی

در صورتی که کلیرانس کراتینین کمتر از ۳۰ میلی لیتر بر دقیقه است، پازوپانیب باید با احتیاط مصرف شود.

بارداری، شیردهی و باروری

مصرف پازوپانیب در دوران بارداری، توصیه نمی شود. بر اساس مکانیسم اثر این دارو، می تواند به جنین آسیب رسان باشد.

- اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید به پزشک خود اطلاع دهید.

- در حین مصرف پازوپانیب و حداقل تا ۲ هفته پس از آن، برای جلوگیری از بارداری از یک روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده کنید.

- اگر در طول درمان با پازوپانیب باردار شدید، به پزشک خود اطلاع دهید.

در حین مصرف پازوپانیب و تا ۲ هفته بعد از پایان درمان، از شیردهی خودداری نمائید. مشخص نیست که آیا ترکیبات پازوپانیب در شیر مادر ترشح می شود یا خیر. در این مورد با پزشک خود صحبت کنید.

بیماران مرد (از جمله کسانی که وازکتومی انجام داده اند) که شریکی دارند که یا باردار می باشد یا ممکن است باردار شود، (از جمله کسانی که از سایر روش های پیشگیری از بارداری استفاده می کنند) باید در حین مصرف پازوپانیب و حداقل ۲ هفته پس از آخرین دوز، در حین رابطه جنسی از کاندوم استفاده کنند. باروری ممکن است تحت تأثیر درمان با پازوپانیب قرار گیرد. در این مورد با پزشک خود صحبت کنید.

رانندگی و استفاده از ماشین آلات

پازوپانیب می تواند عوارض جانبی داشته باشد که ممکن است بر توانایی شما در رانندگی یا استفاده از ماشین آلات تأثیر بگذارد.

اگر احساس سرگیجه، خستگی یا ضعف می کنید یا اگر سطح انرژی شما پایین است از رانندگی یا استفاده از ماشین آلات خودداری کنید.

الزامات پایش

- عملکرد کبد را قبل از درمان و در هفته‌های ۳، ۵، ۷ و ۹، سپس در ماه‌های ۳ و ۴ و پس از آن به صورت دوره‌ای طبق اندیکاسیون بالینی کنترل کنید.

- علائم یا نشانه‌های نارسایی احتقانی قلب را کنترل کنید
- کسر تخلیه ای بطن چپ را در بیماران در معرض خطر نارسایی قلبی، قبل از درمان و در طول درمان کنترل کنید.
- نظارت بر پروتئینوری
- نظارت بر عملکرد تیروئید
- علائم و نشانه های سندروم انسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی (شامل سردرد، فشار خون بالا، تشنج، بی حالی، گیجی، اختلالات بینایی و عصبی) را کنترل کنید - در صورت بروز علائم، درمان را برای همیشه قطع کنید.



۳. پازوپانیب چگونه مصرف می شود؟

همیشه این دارو را دقیقاً همانطور که پزشک به شما گفته است، مصرف کنید. اگر مطمئن نیستید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

نحوه مصرف

دوز معمول ۸۰۰ میلی گرم یک بار در روز می باشد. دوز را می توان به صورت ۲ قرص ۴۰۰ میلی گرمی یا ۴ قرص ۲۰۰ میلی گرمی مصرف کرد. دوز ۸۰۰ میلی گرم یک بار در روز حداکثر دوز روزانه است. در صورت بروز عوارض جانبی، ممکن است نیاز به کاهش دوز باشد. پازوپانیب را تا زمانی که پزشک به شما

توصیه کرده است، مصرف کنید.

زمان مصرف

پازوپانیب را با غذا مصرف نکنید. حداقل دو ساعت بعد از غذا یا یک ساعت قبل از غذا مصرف کنید. به عنوان مثال، می توانید آن را دو ساعت بعد از صبحانه یا یک ساعت قبل از ناهار مصرف کنید. پازوپانیب را تقریباً در زمان ثابتی از روز مصرف کنید. قرص ها را یکی پس از دیگری به طور کامل با آب بلعید. قرص ها را نشکنید یا له نکنید زیرا بر نحوه جذب دارو تأثیر می گذارد و ممکن است احتمال بروز عوارض جانبی را افزایش دهد.

اگر پازوپانیب را بیش از حد لازم مصرف کردید
در صورت مصرف بیش از حد قرص، برای مشاوره با پزشک
یا داروساز تماس بگیرید. در صورت امکان جعبه یا دفترچه
دارو را به آن‌ها نشان دهید.
اگر مصرف پازوپانیب را فراموش کردید
برای جبران دوز فراموش شده، دو دوز مصرف نکنید. فقط دوز
بعدی خود را در زمان معمول مصرف کنید.

۴. عوارض جانبی احتمالی



شایع یا بسیار شایع

ریزش مو، کاهش اشتها، آرتراالژی، ضعف، برادی کاردی، درد

سرطانی، درد قفسه سینه، لرز، سرفه، کم آبی بدن، اسهال، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان، عدم قدرت تکلم، تنگی نفس، عدم تعادل الکترولیتی، ناراحتی های گوارشی، اختلالات گوارشی، خونریزی، تغییر رنگ مو، سردرد، اختلالات کبدی، سکسکه، هایپر بیلی روبینمی، تعریق بیش از حد، فشار خون بالا، هایپوآلبومینمی، کم کاری تیروئید، افزایش خطر عفونت، بی خوابی، اختلال عملکرد بطن چپ، لکوپنی، ناهنجاری های مخاطی، شکایات عضلانی، درد اسکلتی-عضلانی، اختلالات ناخن، تهوع، نوتروپنی، ادم، اختلالات دهانی، نوروپاتی محیطی، پروتئینوری، اختلالات تنفسی، احساس غیرطبیعی، واکنش های پوستی، تغییر حس چشایی،

ترومبوسیتوپنی، اتساع عروق، ترومبوآمبولی وریدی، تاری دید،
استفراغ، کاهش وزن، خستگی، درد شکمی، اختلالات قلبی
مثل کاهش کسر تخلیه بطن چپ و نارسایی احتقانی
قلب، آمبولی ریوی، اریترودیسستزی کف دست و کف پا،
بثورات پوستی، تغییر رنگدانه‌های پوست، تغییرات در غلظت
الکترولیت‌ها و گلوکز، پاراستزی، گرگرفتگی، خون دماغ،
قرمزی، خارش، خشکی پوست، میالژی، اسپاسم عضلانی،
التهاب مخاطی، افزایش کراتینین خون
غیر شایع

نارسایی عروق مغزی، اختلالات چشمی، سندرم اورمیک
همولیتیک، بی‌نظمی سیکل قاعدگی، انفارکتوس میوکارد،

ایسکمی میوکارد، درد حلقی دهانی، پانکراتیت، واکنش حساسیت به نور، پلی سیتی، طولانی شدن فاصله QT، رینوره (نشت مایع مغزی نخاعی از بینی)، زخم پوستی، میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک، آنژین، التهاب صفاق (پریتونیت) نادر یا بسیار نادر

سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی (PRES)
نامشخص

آنوریسم، دایسکشن شریان

۵. شرایط نگهداری پازوپانیب 

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت

نگهداری شود.

دارو را در ظرف اصلی نگهداری کنید و درب آن را محکم ببندید.
دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را پس از تاریخ انقضا (EXP) که روی قوطی و جعبه درج شده است، استفاده نکنید. تاریخ انقضا به آخرین روز آن ماه اشاره دارد.

هیچ دارویی را در فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود بپرسید که چگونه داروهایی را که دیگر استفاده نمی کنید دور بریزید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک خواهد کرد.



۶. محتویات بسته بندی و اطلاعات بیشتر

پازوپانیب محتوی چیست؟

- ماده فعال پازوپانیب (به صورت هیدروکلراید) است. هر قرص روکش دار پازوپانیب ۲۰۰ میلی گرمی، حاوی ۲۰۰ میلی گرم پازوپانیب (به صورت هیدروکلراید) است.
- هر قرص روکش دار پازوپانیب ۴۰۰ میلی گرمی، حاوی ۴۰۰ میلی گرم پازوپانیب (به صورت هیدروکلراید) است.
- سایر ترکیبات موجود در قرص های ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی عبارتند از: میکروکریستالین سلولز، سدیم استارچ گلیکولات، پلی وینیل پیرولیدون، منیزیم استئارات.

محتویات بسته بندی

قرص های روکش دار پازوپانیب ۲۰۰ میلی گرمی، در قوطی های ۳۰ عددی عرضه می شوند.

قرص های روکش دار پازوپانیب ۴۰۰ میلی گرمی، در قوطی های ۳۰ عددی عرضه می شوند.

ما امید از آینده نگه می داریم





شرکت سبحان انکولوژی رشت - ایران

۰۲۱-۸۳۸۷۹۰۰۰

تلفن دفتر مرکزی:


۰۹۰۳ ۹۲۷ ۴۴۳۲

۰۲۱-۸۳۸۷۸

مرکز حمایت از بیماران:

E-mail: SPC@sobhanoncology.com

PZGT-0000-LF-00



Pazopanib

200 mg and 400 mg film-coated tablet



Read the contents of this Booklet
carefully before taking this medicine.



Pazopanib

200 mg and 400 mg film-coated tablet



Manufactured by Sobhan Oncology Co. Rasht - Iran

Read this entire booklet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this booklet. You may need to read it again.
- If you have further questions, ask your doctor or your pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

What is in this booklet:

1. What Pazopanib is and what it is used for
2. What you need to know before you are given Pazopanib
3. How Pazopanib is used
4. Possible side effects
5. How to store Pazopanib
6. Contents of the pack and other information



1. What Pazopanib is and what it is used for

Pazopanib is an inhibitor of multiple tyrosine kinases including those associated with the vascular epidermal growth factor receptor (VEGFR).

Pazopanib is used in adults for:

- First-line treatment of advanced renal cell carcinoma
- Treatment of advanced renal cell carcinoma in patients who have had previous treatment with cytokine therapy
- Treatment of selective subtypes of advanced soft-tissue sarcoma



2. What you need to know before you are given Pazopanib

Do not take Pazopanib:

- if you are allergic to pazopanib or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6)

Cautions

Cardiac disease, hypertension, increased risk of gastrointestinal fistulas, increased risk of gastrointestinal perforation,

increased risk of hemorrhage, increased risk of thrombotic microangiopathy— permanently discontinue if symptoms develop, ischemic stroke, myocardial infarction, risk factors for aneurysm or artery dissection, risk of thrombotic events, susceptibility to QT-interval prolongation (including electrolyte disturbances), transient ischemic attack

Elective surgery: Discontinue treatment 7 days before elective surgery and restart only if adequate wound healing.

Monitoring of blood pressure: Monitor blood pressure regularly.

Important safety information

Risk of aneurysm and artery dissection: Systemically administered VEGF pathway inhibitors may lead to aneurysm and artery dissection in patients with or without hypertension. Patients should be monitored and treated for hyper-

tension as required.

Children and adolescents

Pazopanib is not recommended for people aged under 18. It is not yet known how well it works in this age group. Moreover, it should not be used in children younger than 2 years of age because of safety concerns.

Other medicines and Pazopanib

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines. This includes herbal medicines and other medicines you've bought without a prescription. Some medicines may affect how Pazopanib works or make it more likely that you'll have side effects.

Pazopanib can also affect how some other medicines work. These include:

- clarithromycin, ketoconazole, itraconazole, rifamicin, telithromycin, voriconazole (used to treat infection).
- atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (used to treat HIV).
- nefazodone (used to treat depression).
- simvastatin and possibly other statins (used to treat high cholesterol levels).
- medicines that reduce stomach acid (e.g. proton pump inhibitor, H₂ antagonists or antacids) may affect how pazopanib is taken.

Please consult your doctor or nurse for advice. Tell your doctor or pharmacist if you take any of these.

Pazopanib with food and drink

Don't take Pazopanib with food, as it affects the way the

medicine is absorbed.

Take it at least two hours after a meal or one hour before a meal (see section 3).

Do not drink grapefruit juice while you are being treated with Pazopanib as this may increase the chance of side effects.

Hepatic impairment

Use with caution in mild to moderate impairment; avoid use in severe impairment.

Dose adjustments: Dose reduction to 200 mg daily in moderate impairment.

Renal impairment

Use with caution if creatinine clearance less than 30 mL/minute.

Pregnancy, breast-feeding and fertility

Pazopanib is not recommended if you are pregnant. Based on the mechanism of action of this medicine, it can be harmful to the fetus.

- Tell your doctor if you are pregnant or planning to get pregnant.
- Use a reliable method of contraception while you're taking Pazopanib, and at least for 2 weeks after, to prevent pregnancy.
- If you do become pregnant during treatment with Pazopanib, tell your doctor.

Don't breast-feed while taking Pazopanib and at least for 2 weeks after the end of treatment. It is not known whether the ingredients in Pazopanib pass into breast milk. Talk to

your doctor about this.

Male patients (including those who have had vasectomies) who have partners who are either pregnant or who could become pregnant (including those who use other methods of contraception), should use condoms during sexual intercourse while taking pazopanib and for at least 2 weeks after the last dose. Fertility may be affected by treatment with Pazopanib. Talk to your doctor about this.

Driving and using machines

Pazopanib can have side effects that may affect your ability to drive or use machines.

Avoid driving or using machines if you feel dizzy, tired or weak, or if your energy levels are low.

Monitoring requirement

- Monitor liver function before treatment and at weeks 3, 5, 7, and 9, then at months 3 and 4, and periodically thereafter as clinically indicated.
- Monitor for signs or symptoms of congestive heart failure—monitor left ventricular ejection fraction in patients at risk of heart failure before and during treatment.
- Monitor for proteinuria.
- Monitor thyroid function.
- Monitor for signs and symptoms of posterior reversible encephalopathy syndrome (including headache, hypertension, seizure, lethargy, confusion, visual and neurological disturbances)—permanently discontinue treatment if symptoms occur.



3. How Pazopanib is used

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How much to take

The usual dose is 800 mg taken once a day. The dose can be taken as 2 tablets of 400 mg or as 4 tablets of 200 mg. The dose of 800 mg once a day is the maximum dose per day. Your doctor may need to reduce your dose if you get side effects. Take Pazopanib for as long as your doctor recommends.

When to take

Don't take Pazopanib with food. **Take it at least two hours**

after a meal, or one hour before a meal. For example, you could take it two hours after breakfast or one hour before lunch. **Take Pazopanib at about the same time each day.** Swallow the tablets whole with water, one after the other. Do not break or crush the tablets as this affects the way the medicine is absorbed and may increase the chance of side effects.

If you take more Pazopanib than you should

If you take too many tablets, contact a doctor or pharmacist for advice. If possible show them the pack, or this booklet.

If you forget to take Pazopanib

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Just take your next dose at the usual time.



4. Possible side effects

Common or very common

Alopecia, appetite decreased, arthralgia, asthenia, bradycardia, cancer pain, chest pain, chills, cough, dehydration, diarrhea, dizziness, drowsiness, dry mouth, dysphonia, dyspnea, electrolyte imbalance, gastrointestinal discomfort, gastrointestinal disorders, hemorrhage, hair color changes, headache, hepatic disorders, hiccups, hyperbilirubinemia, hyperhidrosis, hypertension, hypoalbuminemia, hypothyroidism, increased risk of infection, insomnia, left ventricular dysfunction, leucopenia, mucosal abnormalities, muscle complaints, musculoskeletal pain, nail disorder, nausea,

neutropenia, edema, oral disorders, peripheral neuropathy, proteinuria, respiratory disorders, sensation abnormal, skin reactions, taste altered, thrombocytopenia, vasodilation, venous thromboembolism, vision blurred, vomiting, weight decreased, fatigue, abdominal pain, cardiac dysfunction such as a reduction in left ventricular ejection fraction and congestive heart failure, pulmonary embolism, palmar-plantar erythrodysesthesia, rash, skin depigmentation, changes in electrolyte and glucose concentrations, paresthesia, hot flushes, epistaxis, erythema, pruritus, dry skin, myalgia, muscle spasms, mucosal inflammation, increased blood creatinine

Uncommon

Cerebrovascular insufficiency, eye disorders, hemolytic

uremic syndrome, menstrual cycle irregularities, myocardial infarction, myocardial ischemia, oropharyngeal pain, pancreatitis, photosensitivity reaction, polycythaemia, QT interval prolongation, rhinorrhea, skin ulcer, thrombotic microangiopathy, angina, peritonitis

Rare or very rare

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)

Frequency not known

Aneurysm, artery dissection



5. How to store Pazopanib

Store below 30°C. Protect from light and moisture.
Keep in the original package and closed it tightly.

Keep out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date (EXP) which is stated on the bottle and the box. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.



6. Contents of the pack and other information

What Pazopanib contains

- The active substance is pazopanib (as hydrochloride). Each Pazopanib 200 mg film-coated tablet contains 200 mg

pazopanib (as hydrochloride).

Each Pazopanib 400 mg film-coated tablet contains 400 mg pazopanib (as hydrochloride).

- The other ingredients are: microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, polyvinyl pyrrolidone, magnesium stearate

Contents of the pack

Pazopanib 200 mg film-coated tablets are supplied in bottles of 30 tablets.

Pazopanib 400 mg film-coated tablets are supplied in bottles of 30 tablets.

Keeping Hope Alive





Sobhan Oncology, Rasht-Iran

Tel: +98 21 83879000

Patient Support Center: +98 21 83878

E-mail: SPC@sobhanoncology.com

PZGT-0000-LF-00

 **Sobhan Oncology Co.**

Leaflet	<i>Pazopanib</i>	
Color	295 U 	Green C 
	562 C 	288 C 
		3272 C 
Size	75x60 mm	Tolerance: ± 1 mm
File name	PZGT-0000-LF-00	Grammage of internal pages: 58-72 g/m ²
Date	05.09.04	Grammage of page cover: 186-214 g/m ²